水痘ワクチン予防接種 予診票

任意接種用

		_						
※接種希望の方は、 太 り	7ク 内をご記入ください。	診	察前の体	本温			度	分
住 所		TE	L ()		_	
フリガナ 予防接種を受ける人の氏名		男・女	生年月日			年	月	
(保護者の氏名)						(歳	か月)
質問事項			回答欄					医師記入欄
1. 今日受けられる予防接種について説明文を読んで理解しましたか			いいえ)	
2. 【予防接種を受けられる方がお子さんの場合】 2. 分娩時、出生時、乳幼児健診などで異常がありましたか			ある (具体的に))	
3. 今日、普段と違って具合の悪いところがありますか			ある (具体的に))	
4. 現在、何かの病気で医師にかかっていますか			はい (病名)				え	
5. 最近 1 か月以内に何か病気にかかりましたか			はい (病名)			いいえ		
6. 最近1か月以内に近親者や周囲に麻しん、風しん、水痘、おたふくかぜ などにかかった方がいますか			いる (病名)				νı	
7. 最近 1 か月以内に予防接種を受けましたか			はい (予防接種名)				え	
8. 今までに予防接種を受けて、具合が悪くなったことがありますか		ある (具体的に)				ない		
9. 全までに特別な病気 (先天性異常、心臓、腎臓、肝臓、血液、脳神経、免疫不全 変、悪性腫瘍、その他の病気) にかかり、医師の診断を受けたことがありますか		ある (具体的に)				ない		
("ある"の場合) その病気を診てもらっている医師に、今日の予防接種を 受けて良いといわれましたか		はい				いいえ		
10. 今までにひきつけ	. 今までにひきつけ (けいれん) を起こしたことがありますか		ある (ごろ 回くらい) 最後は 年 月ごろ))	
("ある" の場合) ひ	きつけ (けいれん) を起こしたとき、熱は出ましたか	はい	(℃)	しいい	え	
11. 薬や食品で皮膚に ことがありますか	発疹やじんましんが出たり、体の具合が悪くなった	ある (薬、食品		食品名	玄)	ない		
12. 近親者に予防接種を受けて、具合が悪くなった方はいますか			いる (予防接種名)			いない		
13. 近親者に先天性免疫不全と診断されている方はいますか			いる			いない		
14. 最近6か月以内に輸血あるいはガンマグロブリンの投与を受けましたか			はい			いいえ		
1) 現在、妊娠していますか 15.【ご婦人の方に】			はい			いいえ		
2) 接種後2か月間の避妊について説明を受けましたか			はいいえ				え	
16. その他、健康状態の	のことで医師に伝えておきたいことがあれば具体的に	ご記入	くださし) (投	薬状況	など)		

医師の記入欄:以上の問診および診察の結果、今日の予防接種は(可能・見合わせる) 本人(もしくは保護者)に対して、予防接種の効果、副反応および医薬品医療機器総合機構法に 基づく救済について、説明した 医師の署名又は記名押印

医師の診察・説明を受け、予防接種の効果や副反応などについて理解した上で、 接種を希望しますか。(接種を希望します・接種を希望しません)

*

本人の署名(もしくは保護者の署名)

平塚康之

使用ワクチン名 接種質		実施場所·医師名·接種日時						
水痘ワクチン「ビケン」	(皮下接種)	実施場所 にしはら耳鼻咽喉科 北野院						
Lot No.		医師名 平塚康之						
	0.5 mL	接種日時 年 月 日 時 分						

水痘ワクチンの予防接種を受けられる方へ

<ワクチンの効果と副反応>

水痘ワクチンの免疫獲得率は高く、ワクチン接種を受けた人の90%以上の人が免疫を獲得できるといわれています。しかし、いつまで免疫が持続するかについては、獲得した免疫の状況やその後の周りでの流行の程度によって異なります。

副反応としては、ワクチンの接種直後から翌日に発疹、じんましん、紅斑、かゆみ、発熱などがみられることがあります。全身症状として、接種後1~3週間ごろに発熱、発疹、水疱性発疹がみられることがありますが、通常、数日中に消失します。また、帯状疱疹になることがありますが、ワクチン接種を受けない場合とくらべて、同じか低い頻度です。局所症状として発赤、腫脹、硬結などがみられることがあります。アナフィラキシー(全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸、息苦しいなど)や、血小板減少性紫斑病(鼻血、歯ぐきの出血、あおあざができる、出血が止まりにくいなど)、無菌性髄膜炎(発熱、吐き気、頭痛、うなじがこわばり固くなって首を前に曲げにくいなど)がみられることがあります。何か異常が認められた場合には、すぐに医師に申し出てください。

<予防接種を受けるときの注意>

- ① 水痘ワクチンの必要性や副反応について不明な点がある場合は、予防接種を受ける前にお医者さんに相談しましょう。
- ②受ける前日は入浴(またはシャワー)をして、体を清潔にしましょう。
- ③当日は体調をよく観察して、普段と変わったところのないことを確認してください。
- ④清潔な着衣をつけましょう。
- ⑤予診票はお医者さんへの大切な情報です。正確に記入するようにしましょう。
- ⑥予防接種を受ける方がお子さんの場合、母子手帳を持っていきましょう。
- ⑦予防接種を受ける方がご婦人の場合、あらかじめ約1か月間は避妊しておきましょう。

<予防接種を受けることができない人>

- ①明らかに発熱のある人(37.5℃以上)
- ②重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
- ③ 過去に水痘ワクチンに含まれる成分で、アナフィラキシーを起こしたことがある人(他の医薬品投与でアナフィラキシーを起こしたことがある人は、予防接種を受ける前にお医者さんへその旨を伝え、判断を仰いでください)
- 4)妊娠していることが明らかな人
- ⑤その他、お医者さんが予防接種を受けることが不適当と判断した人

<予防接種を受ける際に、お医者さんとよく相談しなくてはならない人>

- ①心臓病、腎臓病、肝臓病や血液の病気などの基礎疾患がある人
- ②発育が遅く、お医者さんや保健師さんの指導を継続して受けている人
- ③ カゼなどのひきはじめと思われる人
- ④前回の予防接種を受けたときに、2日以内に発熱、発疹、じんましんなどのアレルギーを疑う症状がみられた人
- ⑤薬の投与または食事で皮膚に発疹が出たり、体に異常をきたしたことのある人
- ⑥今までにけいれんを起こしたことがある人
- ⑦過去に免疫不全と診断されたことがある人および近親者に先天性免疫不全の人がいる人
- ⑧水痘ワクチンに含まれる成分でアレルギーを起こすおそれのある人
- ⑨家族、遊び友達、クラスメートのあいだに麻しん(はしか)、風しん、おたふくかぜ、水痘(みずぼうそう)などの病気が流行しているときで、まだその病気にかかったことがない人
- ⑩妊娠の可能性のある人

<予防接種を受けたあとの注意>

- ①接種後30分間は病院にいるなどして様子を観察し、アレルギー反応などがあればお医者さんとすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。
- ②接種後4週間は、副反応の出現に注意しましょう。
- ③接種当日の入浴は差し支えありませんが、注射した部位をこすることはやめましょう。
- ④接種当日は接種部位を清潔に保ち、いつも通りの生活をしましょう。ただし、はげしい運動や大量の飲酒は避けましょう。
- ⑤高熱やけいれんなどの異常な症状が出た場合は、速やかにお医者さんの診察を受けてください。
- ⑥接種後2か月間は妊娠しないように注意してください。

あなた	この接種予定		医療機関名
月 当日は受付に 時	日() です おこしください	〒602-8382 京都市上京区今小路通七本松西入末之口町441-1 にしはら耳鼻咽喉科 北野院 電話番号:075-406-1087 FAX番号:075-366-8725